

## Que dois-je savoir concernant Lariam?

- Lariam est un médicament sous prescription médicale destiné à prévenir et à traiter le paludisme. Le paludisme est une infection potentiellement fatale. Lariam ne fonctionne pas dans tous les types de paludisme.
- Comme indiqué par votre médecin, vous devez prendre Lariam : avant votre voyage, pendant votre séjour et après votre retour d'une région paludique.
- Ne prenez pas Lariam si vous avez, ou avez déjà eu des problèmes mentaux, parce que Lariam peut provoquer chez certaines personnes des problèmes mentaux sévères, y compris **suicide, pensées suicidaires et comportement d'auto-mise en danger**.

## Ne prenez pas Lariam si vous avez, ou avez déjà eu :

- une dépression, des pensées suicidaires
- tout autre problème mental, y compris troubles anxieux, schizophrénie ou psychose (perte de contact avec la réalité)
- des convulsions (crises épileptiques ou convulsions)
- une allergie à la quinine, la quinidine, à Lariam ou à un de ses ingrédients
- des troubles graves du foie
- une fièvre bilieuse hémoglobinurique (une complication du paludisme qui touche le sang et les reins).

## Ne prenez pas Lariam si vous prenez actuellement un médicament contre le paludisme appelé :

- Halofantrine.

## Quand dois-je demander conseil à mon prestataire de soins de santé?

- Lors de la prise de Lariam, il est important d'être conscient de ses possibles effets indésirables. Des effets indésirables neuropsychiatriques peuvent survenir lors de la prise de Lariam.
- Ne commencez pas à prendre Lariam si vous courez le risque de développer de tels effets (veuillez-vous référer à « **Ne prenez pas Lariam si...** »).

## Lariam peut provoquer chez certaines personnes des problèmes mentaux sévères. Dites immédiatement à votre médecin si vous ressentez un des effets suivants lors de la prise de Lariam :

- pensées suicidaires,
- comportement d'auto-mise en danger,
- anxiété sévère,
- sentiments de méfiance envers les autres,
- voir ou entendre des choses qui n'existent pas,
- rêves étranges/cauchemars
- insomnie
- dépression,
- sentiment d'agitation,
- comportement inhabituel
- sentiment de confusion.

## Veuillez consulter immédiatement un médecin.

Lariam sera arrêté immédiatement et remplacé par un autre médicament pour la prévention du paludisme.

## D'autres effets indésirables de Lariam peuvent inclure :

Convulsions (crises épileptiques ou convulsions), troubles du foie, troubles du cœur, nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, étourdissements ou pertes d'équilibre (vertiges), maux de tête, troubles du sommeil (sommolence, incapacité à dormir, cauchemars).

## Comment prendre Lariam :

- Prenez les comprimés une fois par semaine, toujours le même jour.
- Commencez à prendre la 1<sup>e</sup> dose de Lariam 10 jours avant votre départ : ceci afin d'être sûr que l'administration de Lariam est bien tolérée.
- Prenez la 2<sup>e</sup> dose 3 jours avant votre départ.
- Vous continuerez à prendre les comprimés tout au long de votre séjour et pendant les 4 semaines qui suivent votre retour.

## Lariam® 250 mg (méfloquine)

Cette carte vous informe sur les possibles effets indésirables mentaux importants de Lariam.

Lisez également la notice pour patient jointe à ce médicament - elle vous donne des informations complètes sur Lariam.

Gardez cette carte avec vous à tout moment.

Présentez cette carte à tous les médecins que vous voyez.

### Quand dois-je demander conseil à mon médecin?

- A tout moment: si vous ressentez des effets indésirables
- Si vous n'êtes pas sûr d'avoir eu l'un des problèmes listés dans la rubrique : **« Ne prenez pas Lariam si... »**
- Si vous pensez que vous pourriez avoir un des effets indésirables mentaux répertoriés dans la rubrique : **« Lariam peut provoquer chez certaines personnes des problèmes mentaux sévères... »**

### Je prends une chimioprophylaxie par Lariam (méfloquine), contre le paludisme.

Nom :

Adresse :

Date de naissance :

Autres médicaments/affections :

### En cas d'urgence veuillez avertir :

Nom du médecin :

Téléphone du médecin :

Cachet du médecin :

RMA version 09/2024

Carte patient  
concernant

**Lariam® 250 mg**  
(mefloquine)

