

### **Wat moet ik over Lariam weten?**

- Lariam is een geneesmiddel dat op voorschrift verkrijgbaar is voor de preventie en behandeling van malaria. Malaria is een mogelijk levensbedreigende infectie. Lariam werkt niet voor alle soorten malaria.
- Zoals uw arts u heeft verteld, moet u Lariam innemen: voordat u op reis gaat, gedurende uw verblijf en na terugkeer uit een malariagebied.
- Gebruik Lariam niet als u psychische problemen heeft of deze ooit heeft gehad, want Lariam kan bij sommige mensen ernstige psychische problemen veroorzaken zoals zelfmoord, zelfmoordgedachten en gedrag waarbij men zichzelf in gevaar brengt.

### **Gebruik Lariam niet als u last heeft of ooit last heeft gehad van:**

- depressie, zelfmoordgedachten
- andere psychische klachten, zoals angststoornis, schizofrenie of psychose (verlies van contact met de werkelijkheid)
- stuipen (epilepsie of toevallen)
- allergie voor kinine, kinidine of Lariam en zijn hulpstoffen
- ernstige leverklachten
- zwartwaterkoorts (een complicatie van malaria die het bloed en de nieren aantast).

### **Gebruik Lariam niet als u op dit moment een geneesmiddel voor malaria gebruikt met de naam:**

- Halofantrine.

### **Wanneer moet ik mijn arts om advies vragen?**

- Als u Lariam gebruikt, is het belangrijk dat u alert bent op mogelijke bijwerkingen. Neuro-psychiatrische bijwerkingen kunnen optreden tijdens het gebruik van Lariam.
- Gebruik Lariam niet als u kans loopt om dergelijke bijwerkingen te ontwikkelen (zie **“Gebruik Lariam niet als...”**).

### **Lariam kan bij sommige mensen ernstige psychische problemen veroorzaken. Vertel het direct aan uw arts als u last heeft van één (of meerdere) van onderstaande bijwerkingen tijdens het gebruik van Lariam:**

- Zelfmoordgedachten,
- gedrag waarbij men zichzelf in gevaar brengt,
- ernstige angstgevoelens,
- gevoelens van wantrouwen ten opzichte van anderen,
- dingen zien of horen die er niet zijn,
- abnormale dromen/nachtmerries
- slapeloosheid (insomnia)
- depressie,
- rusteloosheid,
- ongewoon gedrag
- gevoel van verwardheid.

### **Contacteer onmiddellijk uw arts.**

Het gebruik van Lariam moet onmiddellijk worden stopgezet en vervangen door een ander middel ter preventie van malaria.

### **Andere bijwerkingen van Lariam kunnen zijn:**

Stuipen (epilepsie of toevallen), leverklachten, hartklachten, misselijkheid, overgeven, diarree, buikpijn, duizeligheid of evenwichtsverlies (vertigo), hoofdpijn, slaapproblemen (slaperigheid, niet kunnen slapen, nachtmerries).

### **Hoe neemt u Lariam in:**

- Neem de tabletten eenmaal per week in, altijd op dezelfde dag.
- Neem de 1e dosis Lariam 10 dagen voor uw vertrek:
- dit is nodig om er zeker van te zijn dat toediening van Lariam goed wordt verdragen
- Neem de 2e dosis 3 dagen voor vertrek in.
- Zet de inname van de tabletten voort tijdens uw verblijf en gedurende 4 weken na uw terugkeer.

## Lariam® 250 mg (Mefloquin)

Deze kaart bevat belangrijke informatie voor u over mogelijke psychische bijwerkingen van Lariam.

Lees ook de bijsluiter die u bij dit geneesmiddel ontvangt – daarin staat alle informatie over Lariam.

Draag deze kaart altijd bij u. Laat deze kaart zien aan alle artsen die u raadpleegt.

### Wanneer moet ik mijn arts om advies vragen?

- Altijd: als u bijwerkingen vertoont
- Als u niet zeker weet of u een van de klachten heeft die in de lijst staan vermeld in de rubriek: **“Gebruik Lariam niet als...”**
- Als u denkt dat u mogelijk een van de psychische bijwerkingen heeft die in volgende rubriek vermeld staan: **“Lariam kan bij sommige mensen ernstige psychische problemen veroorzaken...”**

### Ik gebruik malariachemoprophylaxe met Lariam (mefloquine).

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Andere geneesmiddelen/  
aandoeningen:

### In geval van nood, gelieve te verwittigen:

Naam arts:

Telefoonnummer:

Stempel arts:

RMA versie 09/2024

Patiëntenkaart

Lariam® 250 mg  
(Mefloquin)

