

Vad bör jag veta om Lariam-tabletter?

- Lariam är ett receptbelagt läkemedel som används för att förebygga och behandla malaria. Malaria är en livshotande infektion. Lariam är inte verksamt mot alla typer av malaria.
- Ta Lariam-tabletterna enligt anvisningar från läkaren innan du reser, under din resa och efter din återkomst från malariaområdet.
- Ta inte Lariam-tabletter om du har, eller någon gång har haft psykiska störningar eftersom Lariam kan orsaka allvarliga psykiska störningar hos vissa personer så som **själv mord, självmordstankar och självskadebeteende**.

Ta inte Lariam-tabletter om du har, eller någon gång har haft:

- depression, tankar om självmord
- några andra psykiska störningar, så som generaliserat ångestsyndrom, schizofreni eller psykos (förlorad kontakt med verkligheten)
- anfall (konvulsioner eller kramper)
- allergi mot kinin, kinidin, Lariam-tabletter eller någon av dess hjälpämnen
- allvarliga leverproblem
- svartvattenfeber (en komplikation av malaria som påverkar blod och njurar).

Ta inte Lariam-tabletter om du för närvarande använder ett läkemedel mot malaria som heter **halofantrin**.

När ska jag kontakta sjukvårdspersonal?

- Vid användning av Lariam-tabletter är det viktigt att vara medveten om deras eventuella biverkningar. Neuropsykiatriska biverkningar kan uppstå vid användning av Lariam-tabletter.
- Börja inte använda Lariam-tabletter om du har risk att utveckla sådana tillstånd. (Se avsnitt **Ta inte Lariam-tabletter om...**)

Lariam kan orsaka allvarliga psykiska störningar hos vissa personer. Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av följande när du tar Lariam-tabletter:

- självmordstankar
- självskadebeteende
- svår ångest
- känslor av misstro mot andra
- syn- eller hörselstörningar
- depression
- rastlöshet
- ovanligt beteende eller
- förvirring
- sömnlöshet
- mardrömmar/onormala drömmar.

Uppsök läkare omedelbart.

Behandlingen med Lariam-tabletter ska omedelbart avslutas och ersättas med ett annat malariaförebyggande läkemedel.

Andra biverkningar av Lariam-tabletter kan vara

anfall (konvulsioner eller kramper), leverproblem, hjärtproblem, illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, yrsel eller problem med balansen (svindel), huvudvärk, sömnproblem (sömnighet, sömnlöshet, mardrömmar).

Hur du tar Lariam-tabletter:

- Ta tabletterna en gång i veckan, alltid på samma veckodag.
- Ta den första Lariam-dosen 10 dagar innan avresa för att säkerställa att Lariam passar dig.
- Ta en andra dos 3 dagar innan avresa.
- Fortsätt att ta tabletterna under hela din resa och under 4 veckor efter hemkomsten.

90002186/11

Lariam® 250 mg (meflokin)

Detta kort innehåller information om eventuella psykiskt relaterade biverkningar av Lariam-tabletter.

Läs också bipacksedeln som finns i denna förpackning - den ger dig mer detaljerad information om Lariam-tabletter.

Ha alltid detta kort med dig.

Visa alltid detta kort när du besöker en läkare.

När ska jag uppsöka läkare?

- Omedelbart, om du får biverkningar.
- Om du är osäker på ifall du har någon av de listade sjukdomarna (***Ta inte Lariam-tabletter om...***)
- Om du misstänker att du kan ha någon av de listade psykiskt relaterade biverkningarna (***Lariam kan orsaka allvarliga psykiska störningar...***)

Jag tar Lariam-tabletter (meflokin) för att förebygga malaria:

Namn:

Adress:

Födelsedatum:

Andra läkemedel/ sjukdomar:

I nödfall, kontakta:

Läkarens namn:

Läkarens telefonnummer:

Läkarens stämpel:

Kontakta även:

Namn:

Telefonnummer:

Relation:

Godkänt av Fimea 12.07.2024 –
version 2.0



Patientkort

Lariam® 250 mg
(meflokin)

