

Scheda per il paziente Lariam® 250 mg (meflochina)

Questa scheda illustra importanti effetti indesiderati mentali possibili di Lariam®.

La invitiamo a leggere anche il Foglio Illustrativo allegato al medicinale, che riporta informazioni complete su Lariam®.

Porti sempre con sé questa scheda.

La mostri a ogni medico che dovesse consultare.

Cosa devo sapere su Lariam®?

- Lariam® è un medicinale soggetto a prescrizione medica, utilizzato per prevenire e trattare la malaria. La malaria è un'infezione potenzialmente letale. Lariam® non è efficace per tutti i tipi di malaria.
- Come le ha spiegato il medico, dovrà prendere Lariam®: prima di iniziare il viaggio, durante il soggiorno e dopo essere ritornato dall'area malarica.
- Non prenda Lariam® se ha o ha avuto in passato disturbi mentali di qualsiasi genere, poiché Lariam® può causare in alcune persone gravi problemi mentali, inclusi suicidio, pensieri suicidi e comportamento autolesionista.

In alcune persone Lariam® può causare gravi disturbi mentali. Informi immediatamente il medico se dovesse manifestare uno qualunque dei seguenti sintomi nel periodo di assunzione di Lariam®:

- Pensieri suicidari
- Comportamento autolesionista
- Grave ansia
- Senso di diffidenza verso gli altri
- Vedere o sentire cose che non esistono
- Depressione
- Irrequietezza
- Comportamento insolito o
- Senso di confusione mentale
- Insonnia
- Sogni anormali/incubi

Si rivolga immediatamente a un medico.

Lariam® dovrà essere interrotto immediatamente e sostituito con un altro medicinale per la prevenzione della malaria.

Non prenda Lariam® se ha o ha sofferto in passato uno dei seguenti problemi:

- Depressione, pensieri suicidari
- Qualsiasi altro disturbi mentali, inclusi disturbo da ansia, schizofrenia o psicosi (perdita di contatto con la realtà)
- Crisi epilettiche (convulsioni)
- Un'allergia a chinina, chinidina, Lariam® o uno qualsiasi dei suoi componenti
- Gravi problemi epatici
- Febbre emoglobinurica (una complicanza della malaria che colpisce sangue e reni).

Non prenda Lariam® se sta assumendo un medicinale per la malaria chiamato Alofantrina.

Altri effetti collaterali di Lariam® possono includere: Crisi epilettiche (convulsioni), problemi al fegato, problemi al cuore, nausea, vomito, diarrea, dolore addominale, capogiri o perdita dell'equilibrio (vertigini), mal di testa, problemi di sonno (sonnolenza, incapacità di dormire, brutti sogni).

Come prendere Lariam®:

- Prenda le compresse una volta alla settimana, sempre lo stesso giorno. Inizi a prendere la prima dose di Lariam® 10 giorni prima della partenza: in questo modo sarà possibile verificare che tolleri bene la somministrazione di Lariam®.
- Prenda la seconda dose 3 giorni prima della partenza.
- Dovrà continuare ad assumere le compresse per tutta la durata del suo soggiorno e per 4 settimane dopo che sarà tornato.

Quando è opportuno che chieda consiglio all'operatore sanitario?

- Quando si assume Lariam® è importante essere consapevoli dei suoi possibili effetti indesiderati. All'assunzione di Lariam® possono associarsi eventi avversi di natura neuropsichiatrica.

Non inizi a prendere Lariam® se è a rischio di sviluppare tali eventi. (Consultare il paragrafo **Non prenda Lariam® se**).

Quando è opportuno che chieda consiglio al medico?

- In qualsiasi momento: se manifesta effetti indesiderati
- Se non è sicuro di aver manifestato uno dei problemi elencati (*riferimento all'esatta posizione del paragrafo 1*)
- Se ritiene che potrebbe avere uno degli effetti indesiderati elencati (*riferimento all'esatta posizione del paragrafo 3*)

Sto seguendo una chemiopprofilassi per la malaria a base di Lariam® (meflochina).

Nome e cognome:

Indirizzo:

Data di nascita:

Altre terapie farmacologiche/patologie:

In caso di emergenza informare:

Nome e cognome del medico:

Numero di telefono del medico:

Timbro del medico:

Informare anche:

Nome e cognome:

Telefono:

Relazione: