

## Fiche destinée au patient

<p><b>Que dois-je savoir sur Lariam® ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lariam® est un médicament soumis à prescription médicale, utilisé pour prévenir et traiter le paludisme. Le paludisme est une infection potentiellement mortelle. Lariam® n'est pas efficace pour tous les types de paludisme.</li> <li>Comme vous l'a expliqué le médecin, vous devrez prendre Lariam® avant de commencer le voyage, pendant le séjour et après le retour de la zone paludique.</li> <li>Ne prenez pas Lariam® si vous avez ou avez déjà eu un trouble mental de quelque nature que ce soit, puisque Lariam® peut provoquer chez certaines personnes des affections mentales graves, y compris le <b>suicide, des pensées suicidaires et un comportement autodestructeur</b>.</li> </ul>	<p><b>Ne prenez pas Lariam® si vous souffrez ou avez déjà souffert de l'une des affections suivantes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dépression, pensées suicidaires</li> <li>Tous autres troubles mentaux, y compris les troubles de l'anxiété, la schizophrénie ou la psychose (perte de contact avec la réalité)</li> <li>Crises épileptiques (convulsions)</li> <li>Une allergie à la quinine, quinidine, Lariam® ou à l'un de ses composants</li> <li>Troubles hépatiques graves</li> <li>Fièvre hémoglobinurique (une complication du paludisme qui affecte le sang et les reins).</li> </ul> <p><b>Ne prenez pas Lariam® si vous prenez un autre médicament contre le paludisme qui s'appelle Halofantrine.</b></p>	<p><b>Quand demander conseil à un professionnel des soins de santé ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque vous prenez Lariam® il est important d'être conscient de ses effets secondaires possibles. La prise de Lariam® peut être associée à des événements indésirables de nature neuropsychiatrique.</li> </ul> <p>Ne commencez pas à prendre Lariam® si vous êtes à risque de développer de tels événements (voir rubrique « <b>Ne prenez pas Lariam® si</b> »).</p>	<h2>Fiche destinée au patient</h2> <h3>Lariam® 250 mg (méfloquine)</h3> <p>Cette fiche montre les effets secondaires importants mentaux possibles de Lariam®.</p> <p>Veillez également lire la notice jointe au médicament, qui contient des informations exhaustives sur Lariam®.</p> <p>Prenez toujours cette fiche avec vous.</p> <p>Montrez-la à tous les médecins que vous consultez.</p>
<p><b>Lariam® peut causer de graves troubles mentaux chez certaines personnes. Veuillez en informer immédiatement le médecin si l'un des symptômes suivants apparaît pendant la prise de Lariam® :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pensées suicidaires</li> <li>Comportement autodestructeur</li> <li>Anxiété grave</li> <li>Sens de méfiance envers les autres</li> <li>Voir ou entendre des choses qui ne sont pas là</li> <li>Dépression</li> <li>Agitation</li> <li>Comportement inhabituel ou</li> <li>Sens de confusion mentale</li> <li>Insomnies</li> <li>Rêves anormaux/cauchemars.</li> </ul> <p><b><u>Parlez-en immédiatement à un médecin.</u></b> <b><u>Lariam® devra être arrêté immédiatement et remplacé par un autre médicament pour la prévention du paludisme.</u></b></p>	<p><b>Parmi les autres effets secondaires de Lariam®:</b> crises épileptiques (convulsions), troubles du foie, troubles cardiaques, nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, étourdissements ou perte d'équilibre (vertiges), maux de tête, troubles du sommeil (sommolence, incapacité à dormir, mauvais rêves).</p> <p><b>Comment prendre Lariam® :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prenez les comprimés une fois par semaine, le même jour chaque semaine. Commencez à prendre la première dose de Lariam® 10 jours avant votre départ, ce qui vous permet de voir si vous tolérez bien Lariam®.</li> <li>Prenez la deuxième dose 3 jours avant le départ.</li> <li>Vous devrez continuer à prendre les comprimés tout au long de votre séjour et pendant 4 semaines après votre retour.</li> </ul>	<p><b>Quand demander conseil au médecin ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>À tout moment si des effets secondaires apparaissent</li> <li>Si vous n'êtes pas sûr d'avoir ressenti l'un des troubles ci-dessus (<i>référence à la position exacte du paragraphe 1</i>)</li> <li>Si vous pensez que vous pouvez avoir l'un des effets secondaires ci-dessus (<i>référence à la position exacte du paragraphe 3</i>).</li> </ul> <p><b>Je suis sous chimioprophylaxie du paludisme à base de Lariam® (méfloquine).</b></p> <p>Prénom et nom :</p> <p>Adresse:</p> <p>Date de naissance:</p> <p>Autres thérapies médicamenteuses/affections:</p>	<p><b>En cas d'urgence, veuillez informer:</b></p> <p>Prénom et nom du médecin:</p> <p>Numéro de téléphone du médecin:</p> <p>Cachet du médecin:</p> <p><b>Veillez informer également:</b></p> <p>Prénom et nom:</p> <p>Téléphone:</p> <p>Relation:</p>