

Lista di controllo per la prescrizione della chemioprolassi con Lariam® (meflochina) a un paziente

La seguente lista di controllo fornisce una breve guida alle patologie e ai farmaci che rappresentano una controindicazione alla chemioprolassi con meflochina. La lista è stata concepita come ausilio per determinare l'idoneità di un paziente alla chemioprolassi con meflochina e tutte le voci devono essere spuntate in presenza del paziente o di chi si occupa di lui. Se **una** delle risposte alle domande 1–5 della lista di controllo è **“Sì”**, il paziente **non è idoneo** alla prescrizione di meflochina. Ulteriori informazioni sulla meflochina sono riportate nella guida per operatori sanitari allegata.

Compilare la lista di controllo, spuntando le risposte appropriate.

Controindicazioni	Sì	No
1. Il paziente presenta un'ipersensibilità nota alla meflochina o a composti correlati (per es. chinina, chinidina) o ai suoi eccipienti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Il paziente soffre o ha mai sofferto di depressione, disturbo da ansia generalizzata, psicosi, schizofrenia, tentativi di suicidio, pensieri suicidi, comportamento autolesionista o di altro disturbo psichiatrico oppure di convulsioni di qualsiasi origine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Il paziente ha una storia di febbre emoglobinurica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Il paziente presenta una grave compromissione della funzione epatica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Il paziente è attualmente in terapia con alofantrina?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Se **una** delle risposte alle domande 1-5 della lista di controllo è **“Sì”**, il paziente **non è idoneo** alla prescrizione di Lariam® (meflochina).