



Lariam® 250mg (Meflokin)

Denna information beskriver viktiga möjliga neuropsykiatriska biverkningar med Lariam®

Läs också bipacksedeln som medföljer denna medicin - den ger dig en fullständig information om Lariam®.

Behåll detta kort under tiden du behandlas.

Visa detta kort till alla läkare du möter.

När ska jag söka råd från min vårdgivare?

• När du behandlas med Lariam® är det viktigt att vara medveten om dess eventuella biverkningar. Neuropsykiatriska biverkningar kan inträffa under behandlingen med Lariam®.

Börja inte ta Lariam® om du är i riskzonen för att utveckla sådana händelser. (Se vidare under [Ta inte Lariam® om...](#)).

Jag tar malaria-kemoprophylax med Lariam® (meflokin).

Namn:

Adress:

Födelsedatum:

Andra läkemedel och/eller sjukdomar:

I nödfall, vänligen kontakta:

Läkarens namn:

Läkarens telefon:

Läkarens stämpel:

Kontakta även:

Namn:


Telefon:

Relation:



Patientkort

Lariam® 250mg (Meflokin)



Vad bör jag veta om Lariam®?

• Lariam® är ett receptbelagt läkemedel som används för att förebygga och behandla malaria. Malaria är en livshotande infektion. Lariam® är inte verksamt mot alla typer av malaria.

• Du måste ta Lariam® enligt anvisningar från din läkare: innan du reser, under din resa och efter din återkomst från malariaområdet.

• Ta inte Lariam® om du har, eller har haft några neuropsykiatriska besvär eftersom Lariam® kan orsaka allvarliga neuropsykiatriska problem hos vissa personer. Självmord, självmordstankar och självskadande beteende finns rapporterade.

Ta inte Lariam® om du har, eller någon gång vid någon tidpunkt har haft:

- depression, tankar om självmord
- något annat mentalt problem, inklusive generaliserat ångestsyndrom, schizofreni eller psykos (förlorad kontakt med verkligheten)
- krampanfall (epilepsi eller konvulsioner)
- allergi mot klorokin, kinin, kinidin, Lariam® eller någon av ingående hjälpämnen
- allvarliga leverproblem
- svartvattenfeber (en komplikation av malaria som påverkar blod och njurar).

Ta inte Lariam® om du för närvarande behandlas med ett läkemedel mot malaria som heter:

Halofantrin.

När ska jag kontakta min läkare?

- När som helst om du upplever biverkningar
- Om du är osäker på om du har haft några av de problem som räknas upp tidigare
- Om du tror att du kanske har några av de psykiatriska biverkningarna som finns nämnda under **"Lariam® kan orsaka allvarliga neuropsykiatriska besvär hos vissa personer..."**

Lariam® kan orsaka allvarliga neuropsykiatriska besvär hos vissa personer. Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av följande när du tar Lariam®

- självmordstankar,
- självskadande beteende,
- svår oro,
- känslor av misstro mot andra,
- se eller höra saker som inte finns,
- mardrömmar/onormala drömmar,
- sömnlöshet,
- depression,
- rastlöshet,
- ovanligt beteende eller
- förvirring

Vänligen sök medicinsk hjälp omedelbart om du upplever allvarliga psykiska problem eller om ovanstående noteras när du tar Lariam®.

Behandlingen med Lariam bör då avslutas omedelbart och ersättas med ett annat läkemedel för att förebygga malaria.

Andra Lariam® -biverkningar kan vara:

Muskelkramper, leverproblem, hjärtproblem, illamående, kräkningar, diarré, buksmärter, yrsel eller förlust av balans, huvudvärk, sömnproblem (sömnighet, sömnsvårigheter, mardrömmar).

Hur du tar Lariam®

- Använd alltid Lariam enligt läkarens anvisningar.
- Ta alltid veckodosen på samma veckodag.
- Vanlig dos för vuxna: 1 tablett per vecka. Medicineringen skall börja om möjligt 3 veckor men minst 1 vecka före ankomst till malariadrabbat område.

Detta är för att se att Lariam®-administreringen tolereras väl.

- Du ska fortsätta att ta tabletterna under hela din vistelse och under 4 veckor efter hemkomsten.